Méthode pour trouver une représentation de Lewis d'une molécule

<p>1. Ecrire les configurations électroniques de tous les atomes de la molécule et compter les électrons de valence. Ajouter les électrons supplémentaires apportant une charge négative (ou soustraire le nombre d'électrons correspondant à la charge +) En déduire le nombre de doublets de la molécule.</p>	<p style="text-align: right;">Exemple : PO₃¹⁻</p> <p>¹⁵P : 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³ : 5 e- de valence ⁸O : 1s² 2s² 2p⁴ : 6 e- de valence</p> <p style="text-align: center;">Pour PO₃¹⁻</p> <p>PO₃¹⁻ : 5 + 3 x 6 + 1 = 24 électrons soit 12 doublets</p>
<p>2. Identifier l'atome central (le moins électronégatif). Placer les atomes périphériques autour de l'atome central et placer des liaisons simples.</p>	<p>L'atome le moins électronégatif est P</p> $\begin{array}{c} \text{O} - \text{P} - \text{O} \\ \\ \text{O} \end{array}$
<p>3. Répartir les doublets manquant autour des atomes périphériques de manière qu'ils respectent la règle de l'octet (duet pour H). Placer les éventuels doublets restants sur l'atome central</p>	$\begin{array}{c} \overline{\text{O}} - \text{P} - \overline{\text{O}} \\ \\ \overline{\text{O}} \end{array}$
<p>4. Déterminer la charge formelle portée par chaque atome (comparer le nombre d'électrons les plus proches -rang1- par rapport au nombre d'électrons de valence apportés par l'atome)</p>
<p>5. « Rabattre » les doublets des atomes périphériques pour doubler (ou tripler) les liaisons de manière que l'atome central respecte la règle de l'octet.</p>
<p>6. Si l'atome central se situe sur la troisième ligne ou plus bas, alors on continue de déplacer les doublets des atomes périphériques pour doubler les liaisons pour annuler le plus possible de charges formelles.</p>

Si plusieurs structures semblent possibles, on choisit celle qui fait apparaître le moins de charges formelles.