

Héra volet 1 :

Auteurs :

F. VENDITTELLI - CHU de Clermont-Ferrand, France - Audipog, Faculté de médecine, Lyon Est, France

C BARASINSKI - CHU de Clermont-Ferrand, France

C DA COSTA CORREIA - CHU de Clermont-Ferrand, France

B PEREIRA - CHU de Clermont-Ferrand, France

B BRANGER - Réseau de Santé Périnatale des Pays de la Loire, France - Fédération Nationale des Réseaux de Santé en Périnatalité, France

MH BOUVIER-COLLE - Inserm, U 953, UPMC Paris 6, France

Courriel de contact : [fvendittelli@chu-clermontferrand.fr](mailto:fvendittelli@chu-clermontferrand.fr)

Titre de la communication : Politique de la gestion des hémorragies du post-partum au sein des maternités françaises (Hera 1).

France.

### **Introduction :**

Le taux d'hémorragies du post-partum immédiates [HPP] (pertes  $\geq$  500ml) est estimé à 6.09% [95%CI:6.06-6.11]. Un référentiel sur le sujet a été publié en 2004. Cette étude avait pour objectif principal de faire le bilan des politiques de prévention et de prise en charge précoce des hémorragies du post-partum au sein des maternités des réseaux de santé en périnatalité.

### **Méthodologie :**

Il s'agissait d'une étude multicentrique. L'étude ciblait les maternités constituées en réseau de santé en périnatalité (RSP). Cette enquête s'est déroulée de décembre 2009 à avril 2011. Les responsables des maternités devaient remplir un questionnaire sur un site web pour expliciter la politique et les pratiques de leur service concernant les HPP.

### **Résultats :**

Le nombre total de maternités ayant répondu était de 252 maternités sur 281 maternités éligibles pour l'étude. 15 réseaux sur les 25 réseaux participantes ont eu 100 % de leur maternités ayant répondu au questionnaire.

En cas de voie basse : 92,74% des répondants avaient une définition de l'HPP dans leur maternité et 74,29 de l' HHP sévère. 92,80% des maternités avaient une politique de Délivrance dirigée systématique. 89,56% avaient une recommandation portant sur le délai de réalisation d'une délivrance artificielle.

En cas de césarienne : 80,49% des répondants avaient une définition de l'HPP dans leur maternité et 66,95% de l' HHP sévère. 84% des maternités avaient une politique de Délivrance dirigée systématique.

**Discussion :**

Malgré le référentiel de 2004 et la publication de l'étude Euphrates, les pratiques déclarées, n'atteignent pas toujours le taux attendu de 100%.

**Mots clefs :**

1 ; Hémorragie du post-partum

2 ; Accouchement

3 ; Evaluation des pratiques

4 ; Maternités