Groupes sanguins rares en obstétrique

Dr Thibaut RACKELBOOM

Maternité Aliénor d'Aquitaine

CHU
Hôpitaux de
Bordeaux

Caro
Club Anesthésie-Réanimation en Obstétrique

N°	Système	Symbole	Gène(s)	Nombre d'Ag	Nombre d'Ag de prevalence élevée
001	ABO	ABO	<i>ABO</i>	4	0
002	MNS	MNS	<i>GYP A, GYP B, GYP E</i>	48	9
003	P1PK	P1PK	<i>A4GALT</i>	3	1
004	Rh	RH	<i>RHD, RHCE</i>	54	13
005	Lutheran	LU	<i>LU</i>	22	17
006	Kell	KEL	<i>KEL</i>	35	24
007	Lewis	LE	<i>FUT3</i>	6	0
008	Duffy	FY	<i>FY</i>	5	3
009	Kidd	JK	<i>SLC14A1</i>	3	1
010	Diego	DI	<i>SLC4A1</i>	22	3
011	Yt	YT	<i>ACHE</i>	2	1
012	Xg	XG	<i>XG</i>	2	1
013	Scianna	SC	<i>ERMAP</i>	7	5
014	Dombrock	DO	<i>ART4</i>	10	8
015	Colton	CO	<i>AQP1</i>	4	3
016	Landsteiner-Wiener	LW	<i>ICAM4</i>	3	2

018	H	H	<i>FUT1</i>	1	1
019	Kx	XK	<i>XK</i>	1	1
020	Gerbich	GE	<i>GYPC</i>	11	6
021	Cromer	CROM	<i>DAF</i>	18	15
022	Knops	KN	<i>CR1</i>	9	1
023	Indian	IN	<i>CD44</i>	4	3
024	Ok	OK	<i>BSG</i>	3	3
025	Raph	RAPH	<i>CD151</i>	1	0
026	John Milton Hagen	JMH	<i>SEMA7A</i>	6	6
027	I	I	<i>GCNT2</i>	1	1
028	Globoside	GLOB	<i>B3GALT3</i>	2	2
029	Gill	GIL	<i>AQP3</i>	1	1
030	Rh-associated glycoprotein	RHAG	<i>RHAG</i>	4	2
031	Forsman	FORS	<i>GBGT1</i>	1	0
032	Jr	JR	<i>ABCG2</i>	1	1
033	Lan	LAN	<i>ABCB6</i>	1	1
034	Vel	VEL	<i>SMIM1</i>	1	1
035	CD59	CD59	<i>CD59</i>	1	1
036	Augustine	AUG	<i>SLC29A1</i>	2	2

Définition réglementaire en France

Phénotype considéré comme rare
si difficultés en terme de donneurs potentiels compatibles

Prévalence phénotype < 4/1000

(correspond à l'absence d'un Ag
de prévalence >99.6%)

... mais non consensuelle au niveau internationale

> 700 000 sujets d'origine caucasienne en France
ont un phénotype rare + plusieurs dizaines de
milliers d'origine africaine/antillaise

Europe : 30% des sujets avec prise en charge non satisfaisante
USA : 7% des demandes de sang rare non honorées

Outre-mer

Le groupe sanguin rare : 2 principaux contextes

- **Absence d'un Ag érythrocytaire de prévalence élevée dans la population générale**
 - sujets dit « **public négatifs** »
 - risque de développement d'un anticorps dirigé contre l'Ag de fréquence élevé « **Ac anti-public** » ... et d'impasse transfusionnelle !
 - Classiquement IgG / peut être naturel (IgM), cas du Bombay H:-1
 - Caractère récessif, influence de la consanguinité
- Absence d'expression de plusieurs Ag de prévalence équilibrée dans le même système de groupe sanguin
 - ex. D-c-, D-e-, c-e-
- Absence de plusieurs Ag de fréquences équilibrées dans plusieurs systèmes de groupes sanguins (combinaison phénotypique rare)
 - Ex. O, D+C-E+c+e-, K-, Fy(b-), Jk(b-), s-, Do(a-)

Circonstances de découverte du groupe sanguin rare en maternité

Le **suivi de grossesse** est une des situations de découverte:

- ✓ Détermination systématique du groupe sanguin ABO-Rh et phénotype Rh-Kell
- ✓ Présence d'un Ac (RAI) et phénotype érythrocytaire étendu
- ✓ Pathologie foetale ou néonatale (si grossesse non suivie)
- ✓ Étude de fratrie

Implications d'un groupe sanguin rare?

1. En l'absence d'anticorps:

Risque d'immunisation au cours de la grossesse

Risque d'immunisation en cas de transfusion incompatible

2. En présence d'anticorps

Risque foetal: maladie hémolytique foetale

- Fonction de la nature de l'Ac (IgG) : Titre/affinité

- Fonction de l'expression de l'Ag pendant la période foetale et néonatale

3. Transfusion maternelle difficile

Disponibilité d'unités rares compatibles

Fratrie ? Donneurs référencés?

Anticiper l'Hémorragie du Post Partum ?

- 80% des HPP ne sont pas prévisibles !
- Analyse des cas de mortalité maternelle par HPP
 - Retard au diagnostic
 - **Retard à la transfusion**
 - ⇒ importance de la rapidité de mise en œuvre
- HPP avérée : évolution vers forme sévère ?

⇒ ***Nécessité d'organiser une stratégie transfusionnelle pour ces parturientes***

Système de groupe sanguin concerné

- Rareté de la ressource
- Si Ac : dangerosité, titre, évolution de ce titre
- Reste du phénotype, éventuels Ac associés à Ac anti-public

Patiente

- Risque hémorragique
- Taux d'Hb
- Compliance

Critères décisionnels

Facteur temps

- Terme au moment de la découverte (délai/accouchement)
- Délai d'obtention de CGR cryoconservés

Disponibilité des produits

- Disposer de CGR en phase liquide au moment d'accouchement
- Perte de ressources rares, non disponibles pour cas ultérieurs avérés

Stratégie transfusionnelle

Lutte contre l'anémie antepartum

- Apports en **Fer** : voie d'administration selon proximité du terme
 - Per os
 - IV au 3^e trimestre (ou avant selon tolérance / sévérité)
- **Erythropoïétine** au besoin
 - Ne passe pas la barrière placentaire
 - Cas publiés (insuffisances rénales) : pas d'effets indésirables

CHIEF EDITOR'S NOTE: This article is part of a series of continuing education activities in this journal through which a total of 36 AMA PRA Category 1 Credits™ can be earned in 2013. Instructions for how CME credits can be earned appear on the last page of the Table of Contents.

Contemporary Uses of Erythropoietin in Pregnancy: A Literature Review

Laura Sienas, MD,* Tienne Wong, MD,† Rebecca Collins, MD,‡
and James Smith, MD§

As evidenced by numerous case reports, there are several excellent uses for rHuEpo in prenatal care to protect the mother from complications of bleeding during delivery or postpartum hemorrhage. Each case used a slightly different dose of EPO, but there was no dose that seemed to be harmful to the mothers or their fetuses.

⇒ **Objectif d'hémoglobine > 12g ... seuil Transfusion Autologue**

Disponibilité d'une réserve de CGR compatibles ?

- **Centre National de Référence pour les Groupes Sanguins (CNRGS)**

- Fichier national de groupes sanguins rares
- Etude familiale

- Actuellement 150 spécificités rares répertoriées au CNRGS.
 - ~ 13000 sujets (donneurs et receveurs) répertoriés au sein du registre national des sujets présentant un phénotype/génotype érythrocytaire rare
 - ~ 6600 unités de sang rares congelées à la Banque Nationale de Sang de Phénotype Rare (cogérée par l'INTS et l'EFS de l'Ile-de-France).

Disponibilité d'une réserve de CGR compatibles ?

Banque Nationale de Sang de Phénotype érythrocytaire Rare (BNSPR)

- Localisée à Créteil (I-d-F, 94)
- 6500 concentrés **congelés**
 - CGR décongelés valides 7 jours (1j si <2005)
- Temps de **décongélation**
+ temps d'**acheminement**
= environ **2 à 3h** *en région parisienne*
- Pour une hémorragie aiguë : **Non**
- Besoin d'une transfusion différée : **Oui**

Disponibilité d'une réserve de CGR compatibles ?

Banque Nationale de Sang de Phénotype érythrocytaire Rare (BNSPR)

Activité 2008-2013

- 1200 CGR délivrés (dont 4,5% à l'étranger)
- 216 patients
 - 571 épisodes transfusionnels
- 40% des produits délivrés à des patients d'origine africaine/antillaise, dont la plupart drépanocytaires

Disponibilité d'une réserve de CGR compatibles ?

Obtenir des CGR rare en **phase liquide**

- **Prélever donneurs phénocompatibles** : anticiper suffisamment par rapport à la date présumée de l'accouchement mais permettant la congélation des unités si non utilisées (entre 10 et 20j)
- **Décongélation prévisionnelle** d'unités de phénotype rare avec le risque presque systématique de perdre ces produits précieux :
 - risque d'accouchement avant que les CGR décongelés n'arrivent sur site ou après la péremption.
 - Si stock congelé réalisé par la parturiente en amont ou début de la grossesse, décongélation systématique
 - Pour disposer de ces CGR, travail de sensibilisation lors des grossesses antérieures.
⇒ *Plutôt Non si femme enceinte non immunisée / Ac réputés non ou peu dangereux*
- Prélever la parturiente pour **don autologue**

Parfois impossible de disposer de CGR en phase liquide malgré efforts entrepris...

Anticiper transfusion autologue programmée

Don homologue de sang rare

- En fonction de la présence de l'anticorps « anti public » et de sa spécificité, du risque de l'immunisation
- Taux d'Hb minimum: 12 g/dl
- Quand prélever?
 - si trop tôt : CG non utilisables (42j = 6 semaines)
 - si trop tard : anémie lors de l'accouchement
- Idéalement à 35-36 SA
et programmer une 2^e TAD selon le taux d'Hb

Maîtrise de la prise en charge de l'HPP et anticipation

- Centre adapté
 - EFS
 - Radiologie interventionnelle (embolisation)
 - Réanimation maternelle
- Procédure organisée et anticipée
- Surveillance renforcée des pertes sanguines
- Anticipation dans l'algorithme (gestes obstétricaux précoces)

Récupération de sang en peropératoire

- Réticences en obstétrique = risques théoriques
 - ELA, immunisation rhésus
- Peu d'études prospectives contrôlées en obstétrique

Rainaldi et al. *Br J Anaesth.* 1998 ; 80:195-8
Elagamy A et al; *IJOA* 2013; 22:289-93

Nécessite :

- Entraînement des équipes
- Filtre à déleucocyter / filtre 40 µg

C-I :

- Antiseptique iodés / eau stérile / colle
- Sepsis / Phéo
- Liquide méconial

Transfusion de CGR *non* compatibles

- **En l'absence d'Ac :**
 - Risque d'immunisation : futures grossesses compromises
 - **En présence d'Ac :**
 - Estimer le risque en fonction du titre /spécificité de l'anticorps avis EFS/CNRGS
 - Hémolyse: gravité imprévisible
- Possibilité de limiter l'hémolyse post transfusionnelle médicalement?

Transfusion de CGR *non* compatibles

Quelques case reports, aucune étude = niveau de preuve très faible

➤ Objectif : Limiter l'hémolyse post transfusionnelle

Treatment With Intravenous Immunoglobulin and Steroids May Correct Severe Anemia in Hyperhemolytic Transfusion Reactions *Nay Win Transfusion Medicine Reviews 2010*

- Patient drépanocytaire, Ac anti-MNS3(S), anti-FY3, anti-JK2(Jkb)
- Hémolyse après transfusion non compatible lors de chirurgie
- Protocole :
 - Méthylprednisolone 500mg
 - Immunoglobulines IV 0,4 g/kg/j

CASE REPORT

Treatment With Intravenous Immunoglobulin and Steroids May Correct Severe Anemia in Hyperhemolytic Transfusion Reactions: Case Report and Literature Review

Nay Win, Smita Sinha, Edmond Lee, and Wendy Mills

Changes in Hb concentration, absolute reticulocyte count, bilirubin, and LDH after treatment with IVIG (immunoglobulines 0.4g/kg/j) and IV methylprednisolone (500mg) (MP).

Table 1. Summary of Hyperhemolytic Transfusion Reactions: Serologic Investigations, Intervention with IVIG/Steroids (Response: Pre- and Posttreatment Hb Levels)

Diagnosis/reference	Nature of transfusion reactions/ onset after transfusion	Antibodies detected	Pretreatment Hb level	Intervention (IVIG/steroids)	Posttreatment (d) Hb level
SCD/Win et al ³	Acute HHTR/5 d	No RBC antibody	41 g/L	IVIG 1 g/kg per day × 2 d Prednisolone 1 mg/kg per day × 7 d	62 g/L (7 d)
SCD/Win et al ⁶	(a) History of acute HHTR at 26 wk gestation Received IVIG/steroids/blood Hb increased to 80 g/L (b) At 36 wk, gestation Hb dropped to 67 g/L	No RBC antibody	67 g/L	IVIG 0.4 g/kg per day × 5 d No steroids	90 g/L (5 d)
SCD/Win et al ⁷	Delayed HHTR/5 d	Anti-Kn ^a , anti-S, anti-Jk ^b	35 g/L	IVIG 0.4 g/kg per day × 5 d Methylprednisolone 0.5 g per day × 2 d, 1 g per day × 1 day	61 g/L (3 d)
Severe anemia/ Mota et al ⁸	(a) First episode (DHTR)/6 d (b) Second episode acute HHTR/2 d Received 2 RhK cross-matched compatible units Hb dropped to 53 g/L 2 d posttransfusion (c) Third episode acute HHTR Received genotype cross-matched compatible blood, reacted, discontinued transfusion	Anti-c Anti-c with no additional antibody	53 g/L	IVIG + steroids (dose not given)	97 g/L
Refractory anemia/ Muro et al ⁹	(a) First episode DHTR Hb dropped to 57 g/L 4 d posttransfusion (b) Acute HHTR few hours posttransfusion	No RBC antibody Anti HLA (A11 and B35) antibody	57 g/L	IVIG + steroids (dose not given)	Response*

* Signs and symptoms slowly resolved: received HLA-matched I U RBCs 1 week later.

⇒ Concertation multidisciplinaire

- Obstétriciens, Anesthésistes-Réanimateurs, EFS-CNRGS
 - Évaluation du risque obstétrical & fœtal
- Suivi adapté à la grossesse
 - Surveillance clinique, biologique, fœtale
 - Choix du lieu de l'accouchement : plateau technique pour prise en charge précoce, radiologie interventionnelle, EFS
 - Optimisation du taux d'Hb pour l'accouchement : Fer PO/IV, EPO
 - Stratégie d'épargne transfusionnelle : transfusion autologue, cell-saver
 - Structure de délivrance sur place : EFS
- Élaboration d'un protocole consensuel de prise en charge transfusionnel :
 - Produits disponibles
 - Mise en réserve : congelé / phase liquide
 - Protocole en cas de transfusion de sang incompatible

A-R

- CPA précoce
- Optimiser Hb : objectif >12g/dL
- Fer PO

O

- Risque hémorragique
- Évolution grossesse et fœtus
- Voie d'accouchement

EFS / CNRGS

- Risque fœtal
- Réserves en sang (donneurs, fratrie, congelés)
- Risque si transfusion non compatible
- Suivi type et titre Ac

Fer IV ?
EPO ?

TAD ?

**Staff
multidisciplinaire**

Accouchement

- Centre adapté
 - Radio
 - EFS
 - Réanimation

- Gestion HPP & transfusion
 - CGR congelés / phase liquide ?
 - Cell saver ?

Prochain CARO

Bordeaux

29 & 30 mai 2020

53^{ÈME} **Caro**
Club Anesthésie-Réanimation en Obstétrique

CONGRES NATIONAL DU CLUB D'ANESTHÉSIE-REANIMATION EN OBSTÉTRIQUE

29 & 30 MAI 2020 • BORDEAUX
www.caro-club.univ-lyon1.fr

EN +

- ATELIERS PRATIQUES
- SYMPOSIUM
- SESSION POSTERS

COMITE LOCAL D'ORGANISATION :
Pr Karine NOUETTE-GAULAIN
Dr Benjamin JULLIAC
Dr Sandrine PAQUIN
Dr Thibaut RACKELBOOM

ORGANISATION GÉNÉRALE :
all contents
5, Boulevard Pasteur 63 000 Clermont-Ferrand
T. 04 73 28 20 20
congres@allcontents.com