La réanimation initiale avant transfert : HPP

Estelle Morau

CHU Nimes

Estelle.morau@chu-nimes.fr

Pourquoi transférer une HPP ?

- HPP jugulée et transfert pour surveillance (soins critiques) ou rapprochement d'un plateau embolisation
- HPP active avec demande de transfert pour embolisation, en alternative à la chirurgie d'hémostase sur place.
- HPP a bénéficié sur place de toutes les techniques médicales et chirurgicales disponibles et nécessite un complément d'hémostase ou une admission en réanimation.
- « HPP extrahospitalier (accouchement à domicile) »

RPP Urgences obstétricales 2022

Question 4 : Le transfert inter-hospitalier d'une patiente présentant une hémorragie du post-partum avec signes de gravité vers un centre de recours maternel disposant d'un niveau de soins suffisant réduit-il la morbi-mortalité maternelle ?

Experts : Eric Cesareo (SFMU), Mathias Rossignol (SFAR), Emeline Maisonneuve (CNGOF)

ABSENCE DE RECOMMANDATION. A l'heure actuelle, les experts ne peuvent se prononcer sur les modalités et la temporalité du transfert inter-hospitalier d'une patiente présentant une hémorragie du post-partum avec signes de gravité hors structure spécialisée.

« En cas de décision de prise en charge dans l'établissement d'origine, l'équipe SMUR peut rester en renfort médical et paramédical à l'équipe sur place. »

Recommandations de Pratiques Professionnelles
2022

Prise en charge des urgences obstétricales en médecine
d'urgence

Management of obstetric situations in emergency medicine

Recommandations de Pratiques Professionnelles (RPP)
de la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)

En association avec la SFAR (Société Française d'Anesthésie Réanimation)
et le CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français).

A propos d'un cas de demande de transfert.....

- Primigeste 36 ans ATCD de myomectomie et myome praevia
- Anémie et Présence d'agglutinines irrégulières
- Césarienne programmée
- Centre 1 500 naissances/an : dépôt de sang, biologie Pas d'EFS, pas de réanimation maternelle, de d'embolisation.
- Césarienne sous rachianesthésie avec un abord foetal difficile nécessitant deux hystérotomies.
- A extraction: hémorragie sévère par atonie estimée à 2 litres
- Mise en place de sulprostone. Geste chirurgical ?
- Commande de sang avec début de transfusion 1 h 30 après le début de l'hémorragie (1h de préparation acheminement)
- Aucune surveillance biologique (pas hemocue pas bilan sanguin)
- Aucun renfort humain mobilisé.
- Recoit 2 culots et 3 PFC et passage en SSPI
- Demande de transfert vers la réanimation
- Arrivée du SMUR patiente en état de choc, hémoperitoine majeur, hysterectomie, packing
- ACR non récupéré

FdR et plateau technique
Idéal pour accouchement

Prise en charge
HPP

Mobilisation
de moyens humains

Prise en charge quand un transfert doit être envisagé: « **idem...mais en mieux....** »

1. Diagnostic précis quand à sa criticité
2. Réanimation précoce et soutenue
3. Communication anticipée avec toutes les équipes impliquées
4. Equipement et monitoring maximisé
5. Réévaluation régulière

Tout retard à la prise en charge est un frein à la possibilité de transfert

HPP: Diagnostic précis

1. Identification

- Pertes Sanguines > 500ml
- Signes cliniques évocateurs saignement
- Cinétique hémoglobine

2. Evaluation Sévérité

- Débit Hémorragique
- Tolérance Clinique

3. Contextualisation

- Patiente: comorbidités ?
- Etiologie : anomalies Insertion placentaires ?
- Lieu de prise en charge: situation isolée ?

1. Identification HPP

Pertes Sanguines > 500ml

- Quelque soit la voie d'accouchement

RPC 2015

- La **mesure systématique** des pertes participe à la **précocité du diagnostic** (sac gradué, balance..)

350ml

1000ml

250ml

30ml

Evaluation Visuelle ?

100ml

2000ml

D'après Bose P, BJOG 2006; 113:919–924.

2. Identification HPP

Pas de pertes extériorisées hémorragie occulte

Malaise maternel isolé

Pâleur isolée

Dyspnée

Tachycardie isolée

Douleur Thoracique

- Signes cliniques frustrés
- Piège diagnostic

Evaluation de la sévérité

- Importance des pertes
- Débit hémorragique élevé
- Valeur Hb au lit du patient

Piège n°1

- Tolérance Clinique
- Paramètres Hémodynamiques

Piège n°2

Piège N° 1:
Fausse réassurance

Normalité relative de la
première valeur Hb

Piège N° 2: fausse réassurance

Maintien PAS

Baisse de la pression artérielle tardive

Sujet jeune et sain
Mécanismes adaptatifs à hypovolémie

Tachycardie plus spécifique...

Possible bradycardie paradoxale...

Place du shock Index ?

Messages à diffuser

Connaître ces pièges permet de raccourcir les délais diagnostiques et évite de s'orienter vers un diagnostic erroné

Importance contextualisation

Sévérité n'est pas seulement un débit hémorragique....

Patiente

- Age
- Anémie
- Comorbidités
- Petit gabarit

Etiologie

- Anomalies d'insertion placentaire
- Embolie Amniotique

Environnement

- Situation isolement géographique

Weight	Total blood volume*	15% blood volume loss
50kg	5000mls	750mls
55kg	5500mls	825mls
60kg	6000mls	900mls
65kg	6500mls	975mls
70kg	7000mls	1050mls

Coagulopathie

Renfort

Quand l'hémorragie est un symptôme....

Détresse Respiratoire

Convulsion
Trouble conscience

Association de
signes cardinaux
dans une même
temporalité

Embolie Amniotique

Collapsus
TdR
Arrêt cardiaque

Coagulopathie précoce

Particularité de l'hémorragie dans embolie amniotique

Coagulopathie précède l'hémorragie :

- l'hémorragie est la conséquence de la coagulopathie
- Elle est d'emblée cataclysmique et persistante
- Elle est +/- associée à une mauvaise adaptation cardiaque voire à une défaillance cardio-circulatoire

Importance contextualisation

Sévérité n'est pas seulement un débit hémorragique....

Patiente

- Age
- Anémie
- Comorbidités
- Petit gabarit

Etiologie

- Anomalies d'insertion placentaire
- Embolie Amniotique

Environnement

- Situation isolement géographique

Weight	Total blood volume*	15% blood volume loss
50kg	5000mls	750mls
55kg	5500mls	825mls
60kg	6000mls	900mls
65kg	6500mls	975mls
70kg	7000mls	1050mls

Coagulopathie

Renfort

Situation géographique isolée

- Le transfert n'est pas la seule solution à envisager dans ces centres
- Réflexion en amont sur l'accès à des renforts médicaux en fonction des spécialistes disponibles au sein de l'établissement ou à proximité dans le territoire.
- Formations communes avec les urgentistes

Transfert envisagé = communication précoce avec tous les acteurs impliqués

- Idéalement alerte dès la mise en place de sulprostone
- Plateau technique de recours généralement connu
- De MAR à MAR
- Transmission de données factuelles et récentes

Prise en charge
Conjointe
Rythmée

Lecture - Exécution

Exécution - Confirmation

HEMORRAGIE DU POST PARTUM

Saignement > 500 mL ou diagnostic indirect (chute hémoglobine, tachycardie, malaise...)

- Appel de l'équipe obstétricale et anesthésique
- Sac de recueil gradué
- Démarrer feuille spécifique HPP

- Equipe d'anesthésie réanimation**
- Monitoring et Vérifier VVP
 - Anesthésie pour gestes endo-utérins
 - Eviter les halogénés
 - Ocytocine 5 à 10 UI IVL
 - Remplissage par cristalloïdes
 - ± Ephédrine ou Néosynéphrine (objectif PAM 60-65 mmHg)
 - Oxygénothérapie
 - Hémoglobine capillaire
 - Vérification carte de groupe
 - Validité RAI
 - Prévention de l'hypothermie
 - Antibioprophylaxie

- Equipe obstétricale**
- Délivrance artificielle
 - Révision utérine
 - Sondage vésical évacuateur
 - Examen de la filière
 - Sutures
 - Massage utérin

Poursuite du saignement

- Sulprostone : une ampoule de 0,5 mg dans 50 ml de NaCl 0,9% sur une heure
- Acide Tranexamique 1g IVL 10 minutes
- 2^{ème} VVP ≥ 16G
- Bilan : NFS plaquettes, TP, TCA, Fibrinogène ± Hb capillaire
- Sondage vésical à demeure
- Précommande ou commande de PSL [contact EFS]

Si besoin d'une AG: faire induction séquence rapide

Poursuite du saignement

- Option : **Ballon de tamponnement**
- Post césarienne ou doute sur saignement interne : **Echographie** pour éliminer un hémopéritoine

- Remplissage vasculaire
- Bilans biologiques + lactates répétés (si besoin KTA)
- Poursuite sulprostone : 2nde ampoule sur 5h
- Acide tranexamique : renouvellement 1 g sur 4h
- Fibrinogène (objectif : ≥ 2 g/l)
- Calcium : 1 g IVL
- Activer le protocole de transfusion massive
- CGR (objectif > 8 g/dl)
- PFC (ratio 1:1 à 1:2)
- Plaquettes (objectif : > 50 G/l)
- Réanimation du choc hémorragique (cf ACC): noradrénaline, cathéters artériel et central

Hémodynamique instable et/ou hémorragie massive et/ou embolisation non disponible →

CHIRURGIE CONSERVATRICE
(Ligatures artérielles et/ou plicature utérine)

Stabilité Hémodynamique et embolisation disponible →

EMBOLISATION

Poursuite du saignement

- HYSTÉRECTOMIE INTERANNEXIELLE**
- Option : Facteur VII activé recombinant 60-90 µg/kg

Références : Les hémorragies du post-partum. RPC CNGOF 2014 Réanimation du choc hémorragique. RFE SFAR 2014

Réalisée en 2016 par le CAMR, Revalidée en 2019 par CAMR et CARO

HEMORRAGIE DU POST PARTUM
Saignement > 500 mL ou diagnostic indirect (chute hémoglobine, tachycardie, malaise...)

- Appel de l'équipe obstétricale et anesthésique
- Sac de recueil gradué
- Démarrer feuille spécifique HPP

Equipe d'anesthésie réanimation

- Monitoring et Vérifier VVP
- Anesthésie pour gestes endo-utérins
- Eviter les halogénés
- Ocytocine 5 à 10 UI IVL
- Remplissage par cristalloïdes
- ± Ephédrine ou Néosynéphrine (objectif PAM 60-65 mmHg)
- Oxygénothérapie
- Hémoglobine capillaire
- Vérification carte de groupe
- Validité RAI
- Prévention de l'hypothermie
- Antibiotrophylaxie

Equipe obstétricale

- Délivrance artificielle
- Révision utérine
- Sondage vésical évacuateur
- Examen de la filière
- Sutures
- Massage utérin

Poursuite du saignement

- Sulprostone : une ampoule de 0,5 mg dans 50 ml de NaCl 0,9% sur une heure
- Acide Tranexamique 1g IVL 10 minutes
- 2^{ème} VVP ≥ 16G
- Bilan : NFS plaquettes, TP, TCA, Fibrinogène ± Hb capillaire
- Sondage vésical à demeure
- Précommande ou commande de PSL [contact EFS]

Si besoin d'une AG: faire induction séquence rapide

Poursuite du saignement

Option : **Ballon de tamponnement**

Post césarienne ou doute sur saignement interne : **Echographie** pour éliminer un hémopéritoine

Hémodynamique instable et/ou hémorragie massive et/ou embolisation non disponible

CHIRURGIE CONSERVATRICE

(Ligatures artérielles et/ou plicature utérine)

Stabilité Hémodynamique et embolisation disponible

EMBOLISATION

- Remplissage vasculaire
- Bilans biologiques + lactates répétés (si besoin KTA)
- Poursuite sulprostone : 2^{ème} ampoule sur 5h
- Acide tranexamique : renouvellement 1 g sur 4h
- Fibrinogène (objectif : ≥ 2 g/l)
- Calcium : 1 g IVL

- Activer le protocole de transfusion massive
- CGR (objectif > 8 g/dl)
- PFC (ratio 1:1 à 1:2)
- Plaquettes (objectif : > 50 G/l)
- Réanimation du choc hémorragique (cf ACC): noradrénaline, cathéters artériel et central

Poursuite du saignement

HYSTÉRECTOMIE INTERANNEXIELLE

Option : Facteur VII activé recombinant 60-90 µg/kg

Références : Les hémorragies du post-partum. RPC CNGOF 2014 Réanimation du choc hémorragique. RFE SFAR 2014

Réalisée en 2016 par le CAMR, Revalidée en 2019 par CAMR et CARO

HEMORRAGIE DU POST PARTUM

Saignement > 500 mL ou diagnostic indirect (chute hémoglobine, tachycardie, malaise...)

- Appel de l'équipe obstétricale et anesthésique
- Sac de recueil gradué
- Démarrer feuille spécifique HPP

Equipe d'anesthésie réanimation

- Monitoring et Vérifier VVP
- Anesthésie pour gestes endo-utérins
- Eviter les halogénés
- Ocytocine 5 à 10 UI IVL
- Remplissage par cristalloïdes
- ± Ephédrine ou Néosynéphrine (objectif PAM 60-65 mmHg)
- Oxygénothérapie
- Hémoglobine capillaire
- Vérification carte de groupe
- Validité RAI
- Prévention de l'hypothermie
- Antibio prophylaxie

Equipe obstétricale

- Délivrance artificielle
- Révision utérine
- Sondage vésical évacuateur
- Examen de la filière
- Sutures
- Massage utérin

Poursuite du saignement

- Sulprostone : une ampoule de 0,5 mg dans 50 ml de NaCl 0,9% sur une heure
- Acide Tranexamique 1g IVL 10 minutes
- 2^{ème} VVP ≥ 16G
- Bilan : NFS plaquettes, TP, TCA, Fibrinogène ± Hb capillaire
- Sondage vésical à demeure
- Précommande ou commande de PSL [contact EFS]

Si besoin d'une AG: faire induction séquence rapide

Poursuite du saignement

- Option : **Ballon de tamponnement**

- Post césarienne ou doute sur saignement interne : **Echographie** pour éliminer un hémopéritoine

Hémodynamique instable et/ou hémorragie massive et/ou embolisation non disponible →

CHIRURGIE CONSERVATRICE
(Ligatures artérielles et/ou plicature utérine)

Stabilité Hémodynamique et embolisation disponible →

EMBOLISATION

- Remplissage vasculaire
- Bilans biologiques + lactates répétés (si besoin KTA)
- Poursuite sulprostone : 2^{ème} ampoule sur 5h
- Acide tranexamique : renouvellement 1 g sur 4h
- Fibrinogène (objectif : ≥ 2 g/l)
- Calcium : 1 g IVL

- Activer le protocole de transfusion massive
- CGR (objectif > 8 g/dl)
- PFC (ratio 1:1 à 1:2)
- Plaquettes (objectif : > 50 G/l)
- Réanimation du choc hémorragique (cf ACC): noradrénaline, cathéters artériel et central

Poursuite du saignement

- HYSTÉRECTOMIE INTERANNEXIELLE**

- Option : Facteur VII activé recombinant 60-90 µg/kg

Références : Les hémorragies du post-partum. RPC CNGOF 2014 Réanimation du choc hémorragique. RFE SFAR 2014

Réalisée en 2016 par le CAMR, Revalidée en 2019 par CAMR et CARO

Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial

WOMAN Trial Collaborators*

20060 patientes

Mort par HPP

D'autant plus efficace qu'administré < 3H après début d'HPP

HEMORRAGIE DU POST PARTUM

Saignement > 500 mL ou diagnostic indirect (chute hémoglobine, tachycardie, malaise...)

- Appel de l'équipe obstétricale et anesthésique
- Sac de recueil gradué
- Démarrer feuille spécifique HPP

Equipe d'anesthésie réanimation

- Monitoring et Vérifier VVP
- Anesthésie pour gestes endo-utérins
- Eviter les halogénés
- Ocytocine 5 à 10 UI IVL
- Remplissage par cristalloïdes
- ± Ephédrine ou Néosynéphrine (objectif PAM 60-65 mmHg)
- Oxygénothérapie
- Hémoglobine capillaire
- Vérification carte de groupe
- Validité RAI
- Prévention de l'hypothermie
- Antibiotrophylaxie

Equipe obstétricale

- Délivrance artificielle
- Révision utérine
- Sondage vésical évacuateur
- Examen de la filière
- Sutures
- Massage utérin

≤ 30 min

Poursuite du saignement

- Sulprostone : une ampoule de 0,5 mg dans 50 ml de NaCl 0,9% sur une heure
- Acide Tranexamique 1g IVL 10 minutes
- 2^{ème} VVP ≥ 16G
- Bilan : NFS plaquettes, TP, TCA, Fibrinogène ± Hb capillaire
- Sondage vésical à demeure
- Précommande ou commande de PSL [contact EFS]

≤ 30 min

Si besoin d'une AG: faire induction séquence rapide

Poursuite du saignement

Option : **Ballon de tamponnement**

Post césarienne ou doute sur saignement interne : **Echographie** pour éliminer un hémopéritoine

Hémodynamique instable et/ou hémorragie massive et/ou embolisation non disponible

→ **CHIRURGIE CONSERVATRICE**
(Ligatures artérielles et/ou plicature utérine)

Stabilité Hémodynamique et embolisation disponible

→ **EMBOLISATION**

- Remplissage vasculaire
- Bilans biologiques + lactates répétés (si besoin KTA)
- Poursuite sulprostone : 2^{ème} ampoule sur 5h
- Acide tranexamique : renouvellement 1 g sur 4h
- Fibrinogène (objectif : ≥ 2 g/l)
- Calcium : 1 g IVL

- Activer le protocole de transfusion massive
- CGR (objectif > 8 g/dl)
- PFC (ratio 1:1 à 1:2)
- Plaquettes (objectif : > 50 G/l)
- Réanimation du choc hémorragique (cf ACC): noradrénaline, cathéters artériel et central

Poursuite du saignement

HYSTÉRECTOMIE INTERANNEXIELLE

Option : Facteur VII activé recombinant 60-90 µg/kg

Références : Les hémorragies du post-partum. RPC CNGOF 2014 Réanimation du choc hémorragique. RFE SFAR 2014

Réalisée en 2016 par le CAMR, Revalidée en 2019 par CAMR et CARO

Place du tamponnement Intra - Utérin

- Compression de la vascularisation encore active au niveau du lit placentaire, et sur la zone inférieure de l'utérus
- RCT résultats contradictoires
- Etudes d'impact positives: diminution embolisation, chirurgie hémostase
- Meta Analyse Suarez 2020 : Efficacité 85%, particulièrement sur Placenta Praevia et Atonie Utérine
- Meta Analyse BJOG Pingray 2021 sur « HPP atonie utérine réfractaire » pas d'évidence

OMS : nouvelle RECO 2022

Positionnement pour l'utilisation du ballon dans les centres qui ont la possibilité d'escalade thérapeutique : chirurgie et accès aux produits sanguins

WHO recommendation on
**Uterine balloon tamponade
for the treatment of
postpartum haemorrhage**

Uterine balloon tamponade is recommended for the treatment of postpartum haemorrhage due to uterine atony after vaginal birth in women who do not respond to standard first-line treatment, provided the following conditions are met:

- Immediate recourse to surgical intervention and access to blood products is possible if needed.
- A primary postpartum haemorrhage first-line treatment protocol (including the use of uterotonics, tranexamic acid, IV fluids) is available and routinely implemented.
- Other causes of postpartum haemorrhage (retained placental tissue, trauma) can be reasonably excluded.
- The procedure is performed by health personnel who are trained and skilled in the management of postpartum haemorrhage, including the use of uterine balloon tamponade.
- Maternal condition can be regularly and adequately monitored for prompt identification of any signs of deterioration.

(Context-specific recommendation)

Weeks et coll. World Health Organization Recommendation for Using Uterine Balloon Tamponade to Treat Postpartum Hemorrhage. Obstet Gynecol. 2022 Mar 1;139(3):458-462.

HEMORRAGIE DU POST PARTUM

Saignement > 500 mL ou diagnostic indirect (chute hémoglobine, tachycardie, malaise...)

- Appel de l'équipe obstétricale et anesthésique
- Sac de recueil gradué
- Démarrer feuille spécifique HPP

Equipe d'anesthésie réanimation

- Monitoring et Vérifier VVP
- Anesthésie pour gestes endo-utérins
- Eviter les halogénés
- Ocytocine 5 à 10 UI IVL
- Remplissage par cristalloïdes
- ± Ephédrine ou Néosynéphrine (objectif PAM 60-65 mmHg)
- Oxygénothérapie
- Hémoglobine capillaire
- Vérification carte de groupe
- Validité RAI
- Prévention de l'hypothermie
- Antibiotrophylaxie

Equipe obstétricale

- Délivrance artificielle
- Révision utérine
- Sondage vésical évacuateur
- Examen de la filière
- Sutures
- Massage utérin

≤ 30 min

Poursuite du saignement

- Sulprostone : une ampoule de 0,5 mg dans 50 ml de NaCl 0,9% sur une heure
- Acide Tranexamique 1g IVL 10 minutes
- 2^{ème} VVP ≥ 16G
- Bilan : NFS plaquettes, TP, TCA, Fibrinogène ± Hb capillaire
- Sondage vésical à demeure
- Précommande ou commande de PSL [contact EFS]

≤ 30 min

Si besoin d'une AG: faire induction séquence rapide

Poursuite du saignement

Option : **Ballon de tamponnement**

Post césarienne ou doute sur saignement interne : **Echographie** pour éliminer un hémopéritoine

Hémodynamique instable et/ou hémorragie massive et/ou embolisation non disponible

CHIRURGIE CONSERVATRICE

(Ligatures artérielles et/ou plicature utérine)

Stabilité Hémodynamique et embolisation disponible

EMBOLISATION

- Remplissage vasculaire
- Bilans biologiques + lactates répétés (si besoin KTA)
- Poursuite sulprostone : 2nde ampoule sur 5h
- Acide tranexamique : renouvellement 1 g sur 4h
- Fibrinogène (objectif : ≥ 2 g/l)
- Calcium : 1 g IVL

- Activer le protocole de transfusion massive
- CGR (objectif > 8 g/dl)
- PFC (ratio 1:1 à 1:2)
- Plaquettes (objectif : > 50 G/l)
- Réanimation du choc hémorragique (cf ACC): noradrénaline, cathéters artériel et central

Poursuite du saignement

HYSTÉRECTOMIE INTERANNEXIELLE

Option : Facteur VII activé recombinant 60-90 µg/kg

Références : Les hémorragies du post-partum. RPC CNGOF 2014 Réanimation du choc hémorragique. RFE SFAR 2014

Réalisée en 2016 par le CAMR, Revalidée en 2019 par CAMR et CARO

A réévaluer régulièrement+++

HEMORRAGIE DU POST PARTUM

Saignement > 500 mL ou diagnostic indirect (chute hémoglobine, tachycardie, malaise...)

- Appel de l'équipe obstétricale et anesthésique
- Sac de recueil gradué
- Démarrer feuille spécifique HPP

Equipe d'anesthésie réanimation

- Monitoring et Vérifier VVP
- Anesthésie pour gestes endo-utérins
- Eviter les halogénés
- Ocytocine 5 à 10 UI IVL
- Remplissage par cristalloïdes
- ± Ephédrine ou Néosynéphrine (objectif PAM 60-65 mmHg)
- Oxygénothérapie
- Hémoglobine capillaire
- Vérification carte de groupe
- Validité RAI
- Prévention de l'hypothermie
- Antibioprophylaxie

Equipe obstétricale

- Délivrance artificielle
- Révision utérine
- Sondage vésical évacuateur
- Examen de la filière
- Sutures
- Massage utérin

≤ 30 min

Poursuite du saignement

- Sulprostone : une ampoule de 0,5 mg dans 50 ml de NaCl 0,9% sur une heure
- Acide Tranexamique 1g IVL 10 minutes
- 2^{ème} VVP ≥ 16G
- Bilan : NFS plaquettes, TP, TCA, Fibrinogène ± Hb capillaire
- Sondage vésical à demeure
- Précommande ou commande de PSL [contact EFS]

≤ 30 min

Si besoin d'une AG: faire induction séquence rapide

Poursuite du saignement

Option : **Ballon de tamponnement**

Post césarienne ou doute sur saignement interne : **Echographie** pour éliminer un hémopéritoine

Hémodynamique instable et/ou hémorragie massive et/ou embolisation non disponible

CHIRURGIE CONSERVATRICE

(Ligatures artérielles et/ou plicature utérine)

Stabilité Hémodynamique et embolisation disponible

EMBOLISATION

- Remplissage vasculaire
- Bilans biologiques + lactates répétés (si besoin KTA)
- Poursuite sulprostone : 2^{ème} ampoule sur 5h
- Acide tranexamique : renouvellement 1 g sur 4h
- Fibrinogène (objectif : ≥ 2 g/l)
- Calcium : 1 g IVL

- Activer le protocole de transfusion massive
- CGR (objectif > 8 g/dl)
- PFC (ratio 1:1 à 1:2)
- Plaquettes (objectif : > 50 G/l)
- Réanimation du choc hémorragique (cf ACC): noradrénaline, cathéters artériel et central

Poursuite du saignement

HYSTÉRECTOMIE INTERANNEXIELLE

Option : Facteur VII activé recombinant 60-90 µg/kg

Références : Les hémorragies du post-partum. RPC CNGOF 2014 Réanimation du choc hémorragique. RFE SFAR 2014

Réalisée en 2016 par le CAMR, Revalidée en 2019 par CAMR et CARO

⇒ Stratégie transfusionnelle adaptée

Élaborer une procédure d'urgence vitale locale

(dépôt de sang / dotation en facteurs de coagulation / organisation et acheminement)

+ Correction

- du choc
- de l'hypothermie
- de l'acidose

Recommandations pour la Pratique Professionnelle

**Indications de transfusion de plasmas lyophilisés (PLYO)
Chez un patient en choc hémorragique
Ou a risque de transfusion massive en milieu civil
(adulte, enfant et nouveau-né)**

INDICATIONS FOR TRANSFUSION OF LYOPHILIZED PLASMAS (PLYO) IN A PATIENT IN HEMORRHAGIC SHOCK OR IS AT RISK OF MASSIVE TRANSFUSION IN A CIVILIAN ENVIRONMENT (adult, child and newborn)

2020

RPP de la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation
en association avec : SFMU, ADARPEF, CARO, CNCRH, CTSA, EFS, GFRUP, GIHP, SSA

R4 – En cas d'activation d'un protocole de transfusion massive lors d'une hémorragie du péripartum et/ou de catastrophe obstétricale avec coagulopathie, les experts suggèrent de recourir à la transfusion de plasma en complément de concentrés de globules rouges, le choix entre PLYO ou PFC étant guidé par des raisons logistiques, notamment de disponibilité immédiate.

HEMORRAGIE DU POST PARTUM

Saignement > 500 mL ou diagnostic indirect (chute hémoglobine, tachycardie, malaise...)

- Appel de l'équipe obstétricale et anesthésique
- Sac de recueil gradué
- Démarrer feuille spécifique HPP

Equipe d'anesthésie réanimation

- Monitoring et Vérifier VVP
- Anesthésie pour gestes endo-utérins
- Eviter les halogénés
- Ocytocine 5 à 10 UI IVL
- Remplissage par cristalloïdes
- ± Ephédrine ou Néosynéphrine (objectif PAM 60-65 mmHg)
- Oxygénothérapie
- Hémoglobine capillaire
- Vérification carte de groupe
- Validité RAI
- Prévention de l'hypothermie
- Antibiotrophylaxie

Equipe obstétricale

- Délivrance artificielle
- Révision utérine
- Sondage vésical évacuateur
- Examen de la filière
- Sutures
- Massage utérin

≤ 30 min

Poursuite du saignement

- Sulprostone : une ampoule de 0,5 mg dans 50 ml de NaCl 0,9% sur une heure
- Acide Tranexamique 1g IVL 10 minutes
- 2^{ème} VVP ≥ 16G
- Bilan : NFS plaquettes, TP, TCA, Fibrinogène ± Hb capillaire
- Sondage vésical à demeure
- Précommande ou commande de PSL [contact EFS]

≤ 30 min

Si besoin d'une AG: faire induction séquence rapide

Poursuite du saignement

- Option : **Ballon de tamponnement**
 - Post césarienne ou doute sur saignement interne : **Echographie** pour éliminer un hémopéritoine

- Remplissage vasculaire
 - Bilans biologiques + lactates répétés (si besoin KTA)
 - Poursuite sulprostone : 2nde ampoule sur 5h
 - Acide tranexamique : renouvellement 1 g sur 4h
 - Fibrinogène (objectif : ≥ 2 g/l)
 - Calcium : 1 g IVL
 - Activer le protocole de transfusion massive
 - CGR (objectif > 8 g/dl)
 - PFC (ratio 1:1 à 1:2)
 - Plaquettes (objectif : > 50 G/l)
 - Réanimation du choc hémorragique (cf ACC): noradrénaline, cathéters artériel et central

Hémodynamique instable et/ou hémorragie massive et/ou embolisation non disponible

CHIRURGIE CONSERVATRICE
(Ligatures artérielles et/ou plicature utérine)

Stabilité Hémodynamique et embolisation disponible

EMBOLISATION

Poursuite du saignement

HYSTÉRECTOMIE INTERANNEXIELLE

Option : Facteur VII activé recombinant 60-90 µg/kg

Références : Les hémorragies du post-partum. RPC CNGOF 2014 Réanimation du choc hémorragique. RFE SFAR 2014

Réalisée en 2016 par le CAMR, Revalidée en 2019 par CAMR et CARO

Réévaluations régulières avant départ

Physiological parameters	Normal values	Yellow alert	Red Alert
Respirator rate	10-20 breaths per minute	21-30 breaths per minute	< 10 or >30 breaths per minute
Oxygen saturation	96-100%		< 95 %
Temperature	36.0-37.4°C	35-36 or 37.5- 38°C	< 35 or > 38°C
Systolic blood pressure	100-139 mmHg	150 – 180 or 90 – 100 mmHg	>180 or < 90 mmHg
Diastolic blood pressure	50-89 mmHg	90–100 mmHg	>100 mmHg
Heart rate	50-99 beats per minute	100- 120 or 40 -50 beats per minute	>120 or < 40 beats per minute
Neurological response	Alert	Voice	Unresponsive, pain

MEWS : Maternal Early Warning System

- **Clinique** : stabilité hémodynamique,
- **Biologique** dont coagulation +++ mais aussi ionogramme, lactates
- **Echographique** (absence hémopéritoine)
- **Equipement** (VV, sonde urinaire) et monitoring

Attention au « stand by » long

Pantalon anti choc

Recommandation FIGO
Largement utilisé pays
émergents pour permettre les
transferts

En France

Indication de pose $\approx$ contre indication au transfert

- Situations exceptionnelles
- Mode préventif

FIGO recommendations on the management of postpartum hemorrhage 2022. Int J Gynaecol Obstet. 2022

Savoir renoncer à un transfert.....

- Au moins transitoirement
- Devant une dégradation clinique, hémodynamique...
- Mobiliser des ressources en renfort (activer « le plan blanc maternel »)

« En cas de décision de prise en charge dans l'établissement d'origine, l'équipe SMUR peut rester en renfort médical et paramédical à l'équipe sur place. »

Recommandations de Pratiques Professionnelles 2022

Prise en charge des urgences obstétricales en médecine d'urgence

Management of obstetric situations in emergency medicine

Recommandations de Pratiques Professionnelles (RPP)
de la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU)

En association avec la SFAR (Société Française d'Anesthésie Réanimation)
et le CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français).

Pour limiter les transferts : maillage régional

- Repérage précoce des patientes à risques
- Anticipable avant la CPA du 8^{ème} mois !
- Discussion collégiale et feuille de route
- Conventions entre maternités organisés par le réseau de santé périnatale

- Age > 35
- BMI > 35
- Bleeding disorder
- Anemia
- Platelets < 100 000

Effet Multiplicatif
des facteurs de risque

Pre Partum

- Multiple gestation
- > 4 previous vaginal births
- Prior uterine incision
- Large uterine fibroids
- History of previous PPH
- Estimated fetal weight > 4kg
- Polyhydramnios
- Pre-eclampsia
- Chorioamnionitis
- Induction of labor
- Suspected placenta accreta**
- Placenta praevia**
- Low lying placenta**

Post Partum

- Prolonged third stage of labor
- Failure to progress in second stage
- Operative vaginal delivery
- 3rd or 4th degree of perineal
- Laceration
- Cesarean birth
- Difficult placental extraction
- Concealed abruption
- Uterine inversion

Planifier orienter et être en alerte

Conclusion

- Transfert HPP est une situation à haut risque
- La réanimation initiale n'est pas différente mais doit être anticipée, prolongée et monitorée
- La réévaluation est : clinique biologique échographique
- Il faut savoir renoncer à un transport et proposer une aide une situ

55^{ÈME} Congrès National du

CARO

CLUB D'ANESTHÉSIE RÉANIMATION EN OBSTÉTRIQUE

MARSEILLE

WORLD TRADE CENTER
2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

12 & 13 MAI 2023

> COMITÉ LOCAL D'ORGANISATION

Pr Laurent Zieleskiewicz
Pr Marc Leone
Dr Alexandre Lopez

> ORGANISATION GÉNÉRALE : MD EVENTS

24 Rue du Pérou 63000 Clermont-Fd
Tél. : 04 73 36 94 64 / 06 43 05 35
90 Mail : margaux@events-md.fr

Caro
WWW.CARO-CONGRES.FR

Laurent Z.
Marc L.
Alexandre L.

CARO
MARSEILLE
12 & 13 MAI 2023

PROGRAMME
Vendredi 12 mai 2023
Journée

8H30:.....Accueil

8H45:.....Introduction par la Présidente du CARO

9H00:.....**La Parturiente critique**

- *Patiente enceinte en réanimation : les principes, les dernières tendances.*
- *Sepsis et grossesse.*
- *Traumatisme grave chez la patiente enceinte.*
- *Grossesse et SDRA.*
- *Discussion*

10H30:.....**Pause** / Visite des Exposants

11H00:.....**Tout sur la Césarienne**

- *Nouveautés chirurgicales, implications en médecine péri-opératoire.*
- *Apport de l'échographie pour APD et rachi anesthésie.*
- *Comment prédire l'hypOTA post rachi ?*

12H00:.....**Symposium**

- *Monitoring hémodynamique non invasif pour la femme enceinte*
- *Monitoring HD clear sight*
- *Monitoring HD starling*

13H00:.....**Déjeuner** / Visite des Exposants

14H30:.....**Présentation orale des 5 meilleurs abstracts**

10H30:.....**Pause** / Visite des Exposants

16H00:.....**La Parturiente critique (suite)**

- *Grossesse et urgences neurovasculaires*
- *Embolie amniotique, le point en 2023 ?*
- *La femme enceinte a-t-elle toujours un « estomac plein » ?*

17H30:.....**Assemblée Générale du CARO**

20H30:.....**Dîner du congrès**