Orthèses de tronc chez l'adulte

Dr William MARTIN

Praticien hospitalier

Unité Rachis Enfant et Adulte

Hôpital Raymond Poincaré, Garches

Hôpital Ambroise Paré, Boulogne Billancourt

AP-HP Université Paris Saclay

GROUPE RACHIS
GARCHES

ASSISTANCE
PUBLIQUE HÔPITAUX
DE PARIS

A stylized, light blue graphic of a human spine, showing the vertebrae and intervertebral discs, positioned behind the text.

Bilan clinique et radiographique des déformations rachidiennes

Examen clinique

- Taille actuelle, taille à 20 ans, tailles antérieures
- Poids : variation ?
- Inspection: asymétrie pli de taille, scapula, épaules, bassin
- Flèches sagittales en C7, T6, L3, S1 = équilibre sagittal (à décrire)
- Déséquilibre frontal (distance fil-pli interressier)
- Gibbosité (moins de valeur que chez l'enfant)

Plan frontal

Plan sagittal

Plan axial = gibbosité
en mm avec règle à niveau
ou en degrés avec scoliomètre

Examen clinique

La scoliose dégénérative

✓ **Gibbosité**

✓ Asymétrie des flancs, épaules

✓ Modification du profil

Cyphose lombaire dégénérative

Takemitsu, Spine 1988

Mécanismes de compensation du déséquilibre antérieur

- Rétroversion de bassin
- Extension de hanche
- Flexion de genoux
- Rétropulsion des membres supérieurs
- Ou appui des mains sur les cuisses

Mécanismes de compensation du déséquilibre antérieur

- Rétroversion de bassin
- Extension de hanche
- Flexion de genoux
- Rétropulsion des membres supérieurs
- Ou appui des mains sur les cuisses

Penser à rechercher les facteurs limitant la compensation

- Flessum de hanche
- Rétractions des fléchisseurs de hanche
- Limitation/douleur de genoux ou de chevilles

> A traiter systématiquement

Examen clinique

- Raideur rachis?
 - Réductibilité déformation? (manuelle, procubitus)
 - Examen plans sous pelviens: rétractions tendineuses ?
 - Examen neurologique (syndrome extra-pyramidal) ?
-

Raideur

Distance doigts-sol

Schober ou Schober modifié selon MacRae

Raideur

- Mobilité des plans sous-pelviens

Rectus femoris

Ischiojambiers

A stylized, light blue silhouette of a human figure in a dynamic, slightly twisted pose, centered in the background. The figure's arms are raised and bent, and its legs are also bent, suggesting movement or a specific posture. The lines are smooth and flowing.

Le bilan radiographique

Rachis entier F+P

Les têtes fémorales doivent être visibles

EOS corps entier utile si ILM

± Rx rachis entier couché de face
voire clichés segmentaires

Angle (s) de Cobb : **chiffrer l'évolution**

Fluctuations de mesure

Toujours confronter à la clinique

=> ne pas hésiter à vérifier les mesures ou à demander un cliché couché

Vertèbre limite = la plus inclinée

Paramètres rachidiens : **Positionnels**

Lordose lombaire Max

Cyphose thoracique Max

Et pas T1-T12 et L1-L5

Pente Sacrée, Version Pelvienne :

Positionnels

Incidence Pelvienne : **Anatomiques**

NON

Cyphose
thoracolombaire 47°
et lordose lombaire
sur 2 vertèbres 29°

Paramètres pelviens

IP = Incidence pelvienne (anatomique, stable) 53°

VP = Version pelvienne (positionnel, variable) 42°

PS = Pente sacrée (positionnel, variable) 12°

$$IP = VP + PS$$

L'équilibre sagittal

- En situation « normale », corrélation entre paramètres pelviens, lordose et cyphose
- Donc cyphose et lordose doivent être interprétées en fonction des paramètres pelviens

A stylized, light-colored outline of a human figure is centered on a dark blue background. The figure's spine, ribcage, and pelvic region are highlighted with a slightly darker shade of blue, indicating the areas of focus for the text.

Les corsets plastiques lombaire et thoraco-lombaire

Corset plastique

- ✓ Indication :
 - ✓ Déformation évolutive
 - ✓ En attendant la chirurgie
 - ✓ Chirurgie récusée (comorbidités) ou refusée par le patient
 - ✓ Douleurs non soulagées par le corset en tissu
- ✓ Corset court si :
 - ✓ déséquilibre latéral et sagittal modéré
- ✓ Corset haut si :
 - ✓ Important trouble de la statique frontale ou sagittale

Principes biomécaniques des corsets plastiques

- Rétablissement d'un équilibre sagittal
 - Rétablissement d'un équilibre frontal
- = Amélioration posturale et non structurale

Rétablissement d'un équilibre sagittal

- Soutien postérieur du socle lombo-pelvien
 - en lordose, antéversion, antépulsion
 - en évitant l'hypercorrection
- 2 contre-appuis **osseux** antérieurs
 - Appui haut :
 - **xiphoïdien** si déséquilibre minime
 - +/- **sternal** ou **axillaire** si déséquilibre important
 - Appui bas : **pubien** et non viscéral

Rétablissement d'un équilibre frontal

- Soutien de la gibbosité avec 2 contre-appuis dans le plan frontal
- Ouverture du flanc
- Pince taille pour un bon maintien

Appuis hauts

Appuis xyphoïdien et pubien

Photo CH Le Vésinet

3 étapes

- Moulage
- Essayage
- Livraison

Le médecin doit contrôler chaque étape

Moulage

- Numérique :

- Les + :

- Rapide
- Moins onéreux

- Le - :

- Autocorrection = moins optimale

⇒ Bien pour déformation « simple »

- Au plâtre :

- Le + :

- Correction optimale dans la meilleure position tolérable

- Les - :

- Chronophage
- Plus coûteux

⇒ Bien pour toutes les déformations

Moulage au plâtre

- Dans un cadre (ou avec des bâtons)
- Dans le meilleur équilibre frontal et sagittal possible et tolérable
- Correction active +/- aide
= auto-élongation

A faint, stylized illustration of a corset is visible in the background, rendered in a light purple or blue color. It shows the characteristic structure of a corset with laces and a bustier top.

Essayage et livraison du corset

Que vérifiez-vous ?

Essayage et livraison

- Collaboration médecin + appareilleur
- Toujours vérifier le serrage +++ => faire allonger le patient si besoin
- Vérification de l'équilibre frontal et sagittal
- Vérification de la tolérance = 20 minutes de port minimum
- Pas besoin de radiographie avec corset
- Conseils donnés au patient :
 - Mettre le corset en position allongé => positionnement pince-taille +++
 - Bien serrer les sangles basses pour éviter que le corset remonte
- Revoir le patient 3 à 6 mois après voire avant en cas de problème

Effets bénéfiques attendus

Bénéfices attendus

- Diminuer les douleurs
- Améliorer la statique rachidienne
 - dans le plan frontal
 - dans le plan sagittal
- Augmenter la capacité fonctionnelle :
 - périmètre de marche +++
- Ralentir l'évolution du trouble statique

Diminution des douleurs

- Etudes de cohortes ¹ :
 - Avant/après
- Nombre de patients inclus faibles
- Quel facteur de confusion sur effet instantané ?
- Intérêt des RCT pour construire des recommandations et évaluer effet rémanent
- Notre expérience :
 - 60% des camptocormies (n=175)
 - 60% des scolioses évolutives (n=24)
- Rétablissement de l'équilibre sagittal ++ ²

1 Weiss et al Scoliosis 2009

2 Glassman et al Spine 2006

Effet sur le redressement

- Dépend de la réductibilité du déséquilibre
- Corset haut si déséquilibre important
- Intérêt du moulage au plâtre ++
- Importance de la lordose
- Attention aux flessions de hanche et de genoux
- Intérêt de débiter la prise en charge par la rééducation => assouplissement

Amélioration fonctionnelle

- Effet bénéfique sur le périmètre de marche :
 - Parfois spectaculaire chez les patients avec un rétrécissement canalaire :
 - Case report Weiss 2006 : périmètre de marche x 10 (n=1)
 - Prateepavanich 2001 : 314m => 393m (n=21)
 - Non systématique
 - Environ 1/3 de nos patients avec une camptocormie

Ralentir l'évolution de la déformation

- Etude rétrospective
- 271 patients screenés
- 38 patients sélectionnés avec scoliose lombaire ou TL dégénérative
 - Suivi avant corset > 10 ans
 - Suivi après corset > 5 ans
 - **Evolutivité certaine avant corset**
 - Corset plastique court bien fait porté > 6 heures/j

Dégénérative (n=29)

Idiopathique (n=9)

Nombreux effets secondaires du corset

- Gêne à l'habillement ++
- Esthétique ++
- Cutané : EIAS, crêtes, soutien-gorge, scapulas => modifications
- Digestif : penser à desserrer la sangle
- Respiratoire : idem (EFR pour les patients neuro)
- Sphinctériens : parfois très problématique
- Majoration risque de chute

⇒ Test au corset en résine si doute sur observance ou tolérance

⇒ Adapter +++

⇒ Il faut parfois s'abstenir

Limites techniques du corset

- Déformations extrêmes
- Déséquilibres peu réductibles
- Complications orthopédiques irréductibles :
 - fessum de hanche important
 - bassin très oblique
- Obésité et maigreur extrêmes
- Perte d'autonomie

Temps de port

- Pas de recommandations claires
- De façon empirique :
 - 5-6 heures par jour minimum si évolution ou crise douloureuse
 - En fonction des douleurs ou du besoin de redressement
- Temps de port directement corrélé à l'efficacité sur l'évolutivité ?
- **Aucun effet délétère démontré du port prolongé**
- Certains patients ne peuvent plus s'en passer

Prescription d'un corset rigide

- Ordonnance de grand appareillage (TR39 = court, TR49 = haut)
- Pas de reste à charge pour le patient
- Renouvellement possible tous les 3 ans
- Renouvellement anticipé possible si modification staturopondérale
- Coût d'un corset du Vésinet court : environ 900€
- Essayage et livraison avec l'appareilleur +++
- Revoir le patient à 3-6 mois

Autres orthèses

Le corset en tissu baleiné

- Temps de port: selon symptômes
- Ordonnance simple : CML T9
- Remboursement SS: 80 à 120 euros selon hauteur
- Coût = 300€ minimum
- Confection sur mesure par couturière = 1 journée de travail
- Objectif principal = antalgie (évolution ?)
- En complément d'un corset rigide
- A la place du corset rigide si :
 - Peu de déséquilibre et pas d'évolution
 - Ou patient réfractaire au corset rigide

Minerve pour tête tombante

Matériau PP + plasta +++ => souplesse et tolérance au niveau de l'appui mentonnier

Photos de LH Bénot

Siège moulé

- Corset impossible
- Effondrement en position assise (camptocormie)

Autres exemples

- Corset toilé de Saint-Etienne

Equipe de St Etienne

- Corset court à effet 3 points

Equipes de Garches et du Vésinet

Quelques particularités

- Canal lombaire rétréci :
 - Ne pas relordoser
 - Position antalgique ++
 - Spondylolisthesis :
 - Délordoser ++
 - Fractures vertébrales :
 - Corset haut souvent nécessaire pour une bonne immobilisation et un meilleur contrôle de l'équilibre (pas toujours facile à faire accepter)
 - Effet antalgique par blocage de la flexion et de la rotation ++
-

Les différences avec les corsets pour enfants

- Corset adulte :
 - Rétablissement équilibre sagittal = relordose
 - Correction du déséquilibre frontal
 - Soutien de la gibbosité
 - pas de correction de l'angulation
 - Corset enfant :
 - Corset de correction de l'angulation
 - Tolérable car la déformation est très réductible chez l'enfant
-

Messages clés

- Collaboration médecin/appareilleur à chaque étape voire kiné et ergo
- Importance de l'équilibre sagittal
- Attention au serrage et au pince taille !
- Compromis efficacité / tolérance :
 - Ne pas s'entêter
 - Ne pas abandonner trop vite
- Informer le patient des bénéfices attendus :
 - Douleur ++
 - Évolution très probablement
- Bon résultat si :
 - Patient bien informé et d'accord
 - Savoir-faire de l'équipe

Remerciements

- Nadine Chauffert-Yvart
- Christine Guillet
- Jean-Pierre Lazareth
- Catherine Marty
- Jean-Paul Montigny
- Clémence Palazzo

Des questions ?

william.martin@aphp.fr