

Formulaire d'envoi de souche (valable jusqu'en décembre 2025)

Hôpital de la Croix-Rousse
Centre de Biologie Nord– Bât O
Institut des Agents Infectieux 103
Grande Rue de la Croix Rousse
69317 LYON Cedex 04

Directeur : Dr. Anne TRISTAN
Co-directeurs : Pr. Frédéric Laurent
Pr. François Vandenesch
Tél standard IAI : (33) 04 72 07 11 11
Fax : (33) 04 72 07 18 42

Cadre réservé au CNR

PATIENT

Nom (ou étiquette) :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe : F M

EXPÉDITEUR

Laboratoire :
Adresse complète :
(ou tampon)
Nom du biologiste :
Téléphone :
Mail :

SOUCHE isolée de

Type de prélèvement :
Date de prélèvement :
Votre référence dossier :
Espèce identifiée :

PRESCRIPTEUR (si autre qu'expéditeur)

Nom :
Service :
Téléphone :
Mail :

DEMANDE D'ANALYSE (à cocher impérativement)

DANS TOUS LES CAS, JOINDRE LES RÉSULTATS DE L'ANTIBIOGRAMME ET L'ENSEMBLE DES TESTS EFFECTUÉS

▪ Facteurs de virulence / identification :

Détection des gènes codant les toxines superantigéniques, les leucocidines dont la PVL et les exfoliatines
Recherche de lien de clonalité (*joindre courrier motivant la demande*)
Identification d'espèce (*joindre résultats des tests déjà réalisés*)

▪ Résistance aux antibiotiques (*joindre résultats de tous les tests déjà réalisés*)

Détection des gènes *mecA / mecC*
Détection de sensibilité diminuée aux glycopeptides
Uniquement pour S. aureus si et seulement si le laboratoire expéditeur a déterminé des CMI en microdilution de la vancomycine et/ou de la teicoplanine > 1 mg/L. Le CNR ne réalise pas de technique de confirmation pour les staphylocoques à coagulase négative.

Détection de la résistance au linézolide
Détection de la résistance à la daptomycine
Autres résistances (préciser) :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (cocher les bonnes réponses)

Infection nosocomiale Infection communautaire

Portage

Contexte épidémique (*joindre courrier*)

Syndromes toxiques cutanés

Éruption bulleuse généralisée
Impétigo bulleux localisé
Scarlatine

Infections nécrosantes

Furonculose
Récidivante
Pneumonie nécrosante
Leucopénie Hémoptysies

Autre type d'infection, préciser :

Choc toxique staphylococcique

Préciser les critères diagnostiques :

Hypotension systolique
Fièvre > ou = à 38,9°C
Rash diffus maculo-érythrodermique
suivi de desquamation

Associés à des manifestations :

Digestives	Musculaires	Hyperhémie des muqueuses
Rénales	Hépatiques	Hématologiques
Neurologiques		

Choc en période menstruelle

avec utilisation de tampon périodique*
avec utilisation de coupe menstruelle*

* Préciser le modèle :