Quoi de neuf en néonatalogie en 2013 ?

Congrès de la SFAR
18 septembre 2013

Dr Emmanuel Lopez
Service de réanimation néonatale
CHRU de Tours

Cibles de SpO₂

VNI vs CPAP

Voie
administration
surfactant

Devenir des
prématurés

Quelles cibles de SpO₂ pour le nouveau-né prématuré?

Problématique

SUPPORT, NEJM 2010

1316 prématurés
24SA+0 à 27SA+6
24 premières heures de vie

n=654
SpO2=85-89%

n=662
SpO2=91-95%

Décès avant sortie ou ROP	28.3%	32.1%	p=0.21
Décès	19.9%	16.2%	p=0.04
ROP sévère	8.6%	17.9%	p<0.001
BPD	37.6%	46.7%	p<0.05
LPV	3.8%	4.7%	NS

SUPPORT, NEJM 2012

1316 prématurés
24SA+0 à 27SA+6
24 premières heures de vie

n=654
SpO2=85-89%

n=662
SpO2=91-95%

Décès ou survie avec séquelles à 18 mois	30.2%	27.5%	p=0.21
Décès avant 18 mois	22.1%	18.2%	p=0.046
Séquelles neurologiques à 18 mois	9.5%	10.5%	p=0.49

BOOST2, NEJM 2013

1187 prématurés
<28SA
24 premières heures de vie

n=592
SpO2=85-89%

n=590
SpO2=91-95%

Décès ou survie avec séquelles à 2 ans	ARRET DE L'ETUDE		
Décès	23.1%	15.9%	p=0.002
ROP	12.1%	15.7%	p=0.11
BPD	43.1%	44.8%	p=0.68
Lésions cérébrales	12.8%	11.3%	p=0.47

Courbes de mortalité

COT Study, JAMA 2013

1201 prématurés
23SA+0 à 27SA+6
24 premières heures de vie

n=602
SpO2=85-89%

n=599
SpO2=91-95%

Décès ou survie avec séquelles à 18 mois	51.6%	49.7%	p=0.52
Décès	16.6%	15.3%	p=0.54
ROP sévère	12.8%	13.1%	p=0.80
BPD sévère	31.8%	33.1%	p=0.64
Lésions cérébrales	20.6%	23.1%	p=0.27

En résumé

		Cibles SpO2	Mortalité	ROP	Décès ou séquelles neuro à 18 mois
SUPPORT	2010	85-89%	↑	↓	=
	2012	91-95%			
BOOST 2	2013	85-89%	↑	=	
		91-95%			
COT	2013	85-89%	=	=	=
		91-95%

Augmentation cibles de SpO2

VNI vs nCPAP

nCPAP conventionnelle

nCPAP avec Infant Flow SiPAP™

nCPAP : conventionnelle vs Infant Flow

VNI conventionnelle

VNI par Infant Flow SiPAP™ = BiPAP

Review

Neonatology 2013;104:203–209

DOI: 10.1159/000353448

Received: February 21, 2013

Accepted after revision: June 3, 2013

Published online: August 28, 2013

Neonatal Non-Invasive Respiratory Support: Synchronised NIPPV, Non-Synchronised NIPPV or Bi-Level CPAP: What Is the Evidence in 2013?

C.T. Roberts^a P.G. Davis^{a-c} L.S. Owen^{a-c}

^aThe Royal Women's Hospital, ^bMurdoch Childrens Research Institute, and ^cThe University of Melbourne, Parkville, Vic., Australia

VNI vs nCPAP

- VNI : $\searrow$ travail respiratoire
- Support respiratoire post extubation
 - sVNI > nCPAP
 - VNI par BiPAP = nCPAP
- Décès ou DBP
 - VNI conv ou BiPAP = nCPAP

NIPPV trial, NEJM 2013

Décès ou survie avec DBP à 36SA	38,4%	36,7%	p=0.56
Pneumothorax	2,6%	3,6%	p=0.35
Réintubation	59,5%	61,8%	p=0.52

Table S3. Ventilator Types: Relative Frequency of Use.*

Ventilator Type	NIPPV†	nCPAP†
Babylog 8000/8000+	21%	18%
Bird VIP/VIP Gold	9%	1%
Bubble nCPAP	----	9%
Evita 4/XL	7%	2%
Infant Flow	----	23%
Infant Flow Advance	10%	7%
Servo 300/900C/I	5%	1%
Viasys Sipap	43%	31%
Others	5%	8%

MIST

Minimally-invasive surfactant therapy

MIST, Dargaville ADCFNN 2012

nCPAP > 7cmH2O
FiO2 > 0,3 ou 0,35

Étude avant-après

	25-28SA		29-32SA	
	MIST (n=38)	Contrôles (n=41)	MIST (n=23)	Contrôles (n=56)
Intubation <72h	32%	68% *	22%	45%
Surfactant	100%	66% *	100%	39% *
Pneumothorax	7,9%	15%	13%	20%
BPD	29%	29%	0%	3,6%
Durée O2 (jours)	14 (3,3-43)	40 (16-75)*	2,5 (0,79-4,3)	4,5 (3-5,3)*

Surfactant administration via thin catheter

Gosde Kanmaz, Pediatrics 2013

<32SA, MMH
nCPAP, FiO₂>0,4
Salle de naissance

RCT

	Take Care n=100	InSurE n=100
Intubation <72h	30%	45% *
Pneumothorax	7%	10%
Durée nCPAP (h)	78 (24-720)	116 (24-489) *
Durée MV (h)	35,6 (0-756)	64,1 (0-489) *
BPD	10,3%	20,2% *

EPIASURE 2
BMJ 2012

EPICURE

- EPICURE 1

- 1995
- 22-25SA
- n=666

- EPICURE 2

- 2006
- 22-26SA
- n=3133

Caractéristiques périnatales en 2006

	Gestational age (weeks)				
	22	23	24	25	26
Births (including all stillbirths)					
Total	478	594	636	692	733
Live births					
Total (% alive at onset of labour)	152 (56)	339 (81)	442 (89)	521 (95)	580 (98)
Active stabilisation withheld (% live births)	111/152 (73)	55/338 (16)	16/441 (4)	4/520 (1)	3/574 (1)
Admissions for intensive care					
Total (% live births)	19 (13)	217 (64)	381 (86)	498 (96)	571 (98)

Survie néonatale en 2006

	Gestational age (weeks)				
	22	23	24	25	26
Survival to 28 days					
% of live births (95% CI)	3 (1 to 8)	26 (21 to 31)	51 (46 to 56)	73 (68 to 76)	81 (78 to 85)
% of admissions (95% CI)	26 (9 to 51)	41 (34 to 47)	59 (54 to 64)	76 (72 to 80)	83 (79 to 86)
Survival to discharge					
% of live births (95% CI)	2 (0 to 6)	19 (15 to 24)	40 (36 to 45)	66 (62 to 71)	77 (73 to 81)
% of admissions (95% CI)	16 (3 to 40)	30 (24 to 37)	47 (41 to 52)	69 (65 to 74)	78 (75 to 82)

Principales morbidités néonatales en 2006

	Gestational age (weeks)				
	22	23	24	25	26
Total survivors	3	66	178	346	448
Severe bronchopulmonary dysplasia †	2 (67, 9 to 99)	42 (64, 51 to 75)	95 (53, 46 to 61)	136 (39, 34 to 45)	151 (34, 29 to 38)
Retinopathy stage ≥3 (in at least one eye)	1 (33, 1 to 91)	28 (42, 30 to 55)	63 (36, 29 to 43)	73 (21, 17 to 26)	48 (11, 8 to 14)
Severe abnormality on last available cerebral ultrasound scan‡	1 (33, 1 to 91)	4 (6, 2 to 15)	27 (15, 10 to 21)	50 (15, 11 to 19)	53 (12, 9 to 15)
Survival without major morbidity	1 (33, 1 to 91)	15 (23, 13 to 35)	52 (29, 23 to 37)	133 (38, 33 to 44)	222 (50, 45 to 54)

Comparaison courbes de survie néonatale entre 1995 et 2006

24 weeks

25 weeks

Comparaison des morbidités néonatales entre 1995 et 2006

Séquelles motrices à 3 ans en 2006

Séquelles cognitives à 3 ans en 2006

Comparaison séquelles neurologiques entre 1995 et 2006

Qu'est ce que cette étude apporte ?

- Entre 1995 et 2006, chez 22-25SA
 - ↗ nombre admission en NICU = 44%
 - ↗ survie
 - = morbidités néonatales majeures

 - ↗ problèmes médicaux à long-terme dans cette population

Qu'est ce que cette étude apporte ?

- Entre 1995 et 2006, chez 22-25SA
 - ↗ survie sans séquelles à 3 ans
 - persistance risque de séquelles neurologiques majeures à 3 ans
 - 20% à 26SA
 - 45% à 23SA

La néonatalogie en 2013